

Paciente 2. D. Manuel, farmacéutica Patricia Escribá

INFORMACIÓN OBTENIDA EN LA CONSULTA

Medicación que toma:

1. Persantin (dipiridamol), 1/0/1
2. Sintron 4 mg (acenocumarol), un tercio//0/0
3. Daflon (diosmina), 1/0/1
4. Nolotil 750 (metamizol), 1/0/1
5. Seguril (furosemida), 1/0/1
6. Carduran neo (doxazosina), 1/0/0

Otra información:

-88 años, ha sido leñador

-Muy despierto, recuerda todo perfectamente

-Lo único que no tiene controlado es su dolor lumbar, que le preocupa mucho aunque lo aguanta; su farmacéutica insiste en que le duele demasiado

EVALUACION FARMACOTERAPÉUTICA

1. Necesario. Efectivo. Seguro.
2. Necesario. Efectivo. Seguro.
3. Necesario. Efectivo. Seguro.
4. Necesario. **No Efectivo. No seguro** (puede estar disminuyendo el efecto de 5)
- 5+6. Necesario. Efectivo. Seguros.

INFORME FARMACOTERAPÉUTICO

Se propone cambiar el analgésico (Metamizol) por otro más apropiado para este paciente, por ejemplo Paracetamol asociado a Codeína pautado cada 8 horas (no a demanda). Para ello se necesita la colaboración de su médico, puesto que fue él quien prescribió el Metamizol.

Si de esa forma se consiguiera disminuir su dolor, podría pensarse en la posibilidad, en una nueva evaluación, de disminuir la dosis del diurético.

Está descrita, por otra parte en algunos pacientes, interacción entre dipiridamol y acenocumarol (pudiendo aumentar el efecto y la toxicidad de éste último), que aunque hay poca probabilidad de que se manifieste, de hacerlo el riesgo sería grave en este paciente; por lo que se recomienda estar atento al posible riesgo de hemorragia, que además puede ocurrir sin variar el tiempo de protombina. De producirse, habría que efectuar una nueva evaluación de la medicación.

INFORME OTRAS TERAPIAS

Existe un problema potencial: "Riesgo de caídas". Es una persona de edad avanzada, que refiere además dolor y está polimedicada (especialmente importante la terapia anticoagulante).

Recomendación: Valorar el riesgo real de caídas del paciente a fondo con la escala habitual que se utilice en su centro y realizar un seguimiento por si cambia su situación.

MODELO DE INFORME AL MÉDICO

Farmacia _____

Estimado Dr.: _____

El paciente D. Manuel _____

Está tomando al día de hoy, entre otros, los siguientes medicamentos: Nolotil 750 (dos comprimidos al día), Seguril, Carduran neo.

Manifiesta seguir padeciendo fuerte dolor lumbar.

Estudiada la medicación buscando una posible causa, encontramos que el Nolotil, además de no estar cumpliendo su objetivo analgésico, podría estar disminuyendo el efecto del Seguril.

Lo que ponemos en su conocimiento para que **evalúe la posibilidad** de cambiarle el analgésico a otro no AINE, pautado, por ejemplo Paracetamol asociado a un opiáceo menor (Codeína); puesto que, si bien cabría un aumento de dosis al existir aún margen terapéutico, no sería conveniente en este paciente por el posible efecto sobre el Seguril.

Atentamente:

Patricia Escribá, Farmacéutica